9. Eta.

Fix generic to the geometric case

Banach affine

$\Psi^{-\infty}_{\Delta\infty}(x) \longrightarrow \Psi^{\mathbb{Z}}_{\Delta\infty}(x) \longrightarrow A^{\mathbb{Z}}_{\Delta\infty}(x)$

pseudo differential operators with "symbolic" parameter

$C^\infty(S(\mathbb{R}\times T^*\times 1))\ [\Gamma\Gamma\rho^{-1}]$

affine bundle of [cotangent bundle not exactly trivial due]

$G^{-\infty}_{\Delta\infty}(x) \longrightarrow G^{\mathbb{Z}}_{\Delta\infty}(x) \longrightarrow E^{\mathbb{Z}}_{\Delta\infty}(x)$

$c_0 \downarrow \mathbb{Z}$ $\qquad \eta \downarrow \mathbb{C}$

$c_1 = \frac{1}{2\pi i}\int \mathrm{Tr}(A^{-1}\frac{\partial A}{\partial t}) = \frac{1}{2\pi i}\mathrm{Tr}_\Sigma(A^{-1}\frac{\partial}{\partial t}A)$

$\eta = \overline{\mathrm{Tr}}_\Sigma(A^{-1}\frac{\partial A}{\partial t})$

$\tau = e^{2\pi i \eta}$ 'determinant'

$\frac{1}{2\pi i}\delta\eta = \frac{1}{2\pi i}\mathrm{Tr}_R(A^{-1}\delta A)$ 1st obstruction class class

$\sim \frac{1}{2\pi i}\delta\log\tau$